Luca Eeckhaut
4C5
Tuteur : Michel Koch
2025/2026

# Les hétérochronies

# Table des Matières :


***1 : Introduction*** ..... ***4***

***2 : L'histoire*** ..... ***4***

***3 : Les hétérochronies fondamentales*** ..... ***7***

**3.1 : Les pédomorphoses** ..... **7**

3.1.1 : La néoténie ..... 8

Exemples d'animaux : ..... 9

1. L'axolotl (Ambystoma mexicanum) ..... 9
2. Le protée (Proteus anguinus) ..... 10
3. Certaines espèces de tritons ..... 10
4. Les olms (Necturus maculosus) ..... 10
5. Les larves de certains insectes ..... 11
6. Les humains et la néoténie ..... 11

3.1.2 : La progenèse ..... 11

Exemples d'animaux ..... 12

1. Les salamandres du genre Ambystoma ..... 12
2. Les Polychètes ..... 13
3. Les Crustacés : Sacculina carcini ..... 13
4. Les Insectes : Les Pucerons ..... 13
5. Les Échinodermes : Les Oursins ..... 14
6. Les Rotifères Bdelloïdes ..... 14
7. Les Nématodes : Strongyloides stercoralis ..... 14

**3.2 : Les péramorphoses** ..... **15**

3.2.1 : L'accélération ..... 15

Exemples d'animaux : ..... 16

1. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*) ..... 16
2. Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) ..... 16
3. Le Narval (Monodon monoceros) ..... 17
4. Le Moineau domestique (Passer domesticus) ..... 17

3.2.2 : Hypermorphose ..... 18

Exemples d'animaux : ..... 19

1. Megaloceros (Cerf géant des tourbières) ..... 19
2. Le cerveau humain ..... 19
3. Les Sauropodes (Dinosaures géants) ..... 20
4. Le Grand Pingouin (Pinguinus impennis) ..... 20
5. Les "Salamandres géantes" du Japon ..... 20

***4 : Évolution en mosaïque*** ..... ***21***

4.1 : L'hyperpédomorphose ..... 21

4.2 : L'hyperpéramorphose ..... 22

4.3 : Nanisme ..... 23

4.4 : Gigantisme ..... 24

*5 : Les stratégies développementales ..... 25*

**5.1 : Le développement direct ..... 25**

**5.2 : Le développement indirect ..... 26**

*6 : Conclusion ..... 27*

*7 : Sources ..... 28*

# 1 : Introduction

Les hétérochronies sont des mécanismes fascinants de l'évolution qui modifient le rythme du développement des êtres vivants par rapport à leurs ancêtres.
Imaginez un animal dont la croissance s'accélère, ralentit, ou s'arrête à un stade juvénile, ces changements, appelés hétérochronies, influencent la taille, la forme et même le comportement des espèces.
Par exemple, certains animaux conservent des traits de jeunesse toute leur vie, tandis que d'autres développent des caractéristiques nouvelles en grandissant plus longtemps.
Ces phénomènes, étudiés depuis le XIXe siècle, montrent comment l'évolution agit non seulement sur les gènes, mais aussi dans le temps.
Des salamandres aux dinosaures, en passant par les humains, les hétérochronies expliquent une partie de la diversité du vivant.
Ce travail explore leurs différents types, leurs exemples marquants et leur rôle dans l'adaptation des espèces à leur environnement.

# 2 : L'histoire

On commence en 1828 avec Karl Ernst von Baer, un biologiste allemand, qui énonça une loi qui porte son nom, la loi de von Baer.



Cette loi stipule que les caractères généraux des embryons visibles tôt dans leur développement, seront remplacés progressivement par des caractères plus spécifiques selon l'espèce.

Par exemple les embryons d'un poisson et d'un mammifère se ressemblent dans les premiers stades, puis se différencieront progressivement en développent des caractères qui leur sont propres.

Mais c'est en 1868 que Ernst Haeckel, biologiste et philosophe allemand, a déclaré que : l'ontogenèse récapitule la phylogenèse.
Pour rappel l'ontogenèse c'est le développement de l'individu de sa création jusqu'à sa mort et la phylogenèse c'est l'opposé, en gros c'est l'ensemble des transformations qui aboutissent à la différenciation progressive des espèces.
Il utilise le principe de von Baer pour expliquer son raisonnement *(Tous les êtres vivants commencent leur ontogenèse par la même morphologie, la même architecture, et c'est au cours de l'ontogenèse que les différences propres de l'espèce se font).*
Il énonce alors que lors du développement d'une espèce, on récapitule tous les stades ancestraux avant l'arrivée à l'espèce moderne.
C'est le principe de la récapitulation.

Voici le premier principe d'Haeckel qui explique son hypothèse, on voit que l'espèce 2 récapitule le stade propre à l'espèce 1 avant d'ajouter son propre caractère.
L'espèce 3 va alors récapituler les caractères ancestraux c'est-à-dire ceux de l'espèce 1 et 2 avant d'ajouter son propre caractère qui sera ensuite récapitulé par les prochaines espèces.
Les caractères sont simplement ajoutés à la fin du développement, c'est ce qu'on appelle le principe de l'addition terminale.
Le problème c'est que si chaque nouvelle espèce continue d'ajouter ces caractères spéciaux les uns après les autres on finira par avoir un animal de plus en plus grand.



## 2e principe de Haeckel :

Haeckel va donc faire un deuxième schéma :
Dans ce deuxième shéma la taille adulte n'augmente pas après l'éspèce 3 mais les caractères des futurs éspèces sont quand même ajoutées.
Mais par contre il faudra que la durée de développement des caractères soient raccourcis, pour que les individus n'augmentent pas en taille.
C'est le principe de condensation par acceleration.




## 3e principe de Haeckel :

Il existe aussi une troisième possibilitée.
Toujours dans le cas ou les tailles adultes n'augmentent pas, un stade de l'ancètre disparait pour laisser la place à un nouveau.
C'est le principe de condensation par délétion.
Mais ce principe ne sera pas retenu par la suite car on constatera que le caractère bleu qui n'était présent que chez l'éspèce 2 et 3 était finalement toujours présent chez les autres éspèces bien qu'un court laps de temps, mais toujours présent.




## Horloge de Gould

Il faudra attendre jusqu'en 1977 pour que Stephen J. Gould reconnaisse les principes de Haeckel.
Il mettra au point une horloge qui porte son nom aujourd'hui pour représenter graphiquement les hétérochronies.
Sur cette horloge on voit les trois « parties » de l'évolution : un changement dans la taille, un changement dans la forme et un changement dans la maturité sexuelle.
Et au millieu en tirets on voit la référence ancéstrale théorique qui pour toutes les éspèces se trouve à midi.



Les aiguilles vont donc montrer le décalage par rapport au traits ancéstraux.
Plus les aiguille seront à droite plus l'individu sera grand avec plus de nouveautées et vers la gauche l'individu sera plus petit et ressemblera au juvénile de l'ancètre.
Si la flèche de la maturitée sexuelle est à droite elle sera plus tardive et si elle est à gauche elle sera plus précoce.

Kenneth J. McNamara quant à lui revient en 1982 aux cartouches de Haeckel qui sont selon lui plus pratiques, la taille des cartouches représentant évidemment le temps de développement des caractères.
Mais la maturité sexuelle est manquante sur ce schéma.




C'est l'école de Dijon en 1985 qui va rajouter ce paramètre qui est représenté par cette flèche rouge.




# 3 : Les hétérochronies fondamentales

Donc par rapport à l'ancêtre on peut soit développer de nouveaux caractères, soit en perdre
Nous voyons donc ici deux cas évolutifs qui se distinguent : la péramorphose et la pédomorphose.

## 3.1 : Les pédomorphoses

La pédomorphose c'est le cas où le descendant adulte ressemble au juvénile de l'ancêtre, il va donc perdre des caractères au fil des générations

## 3.1.1 : La néoténie

La néoténie c'est le fait de conserver des caractéristiques des juvéniles ancestraux au stade adulte, c'est la capacité pour un animal de se reproduire en conservant une forme immature.
La néoténie affecte l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement d'un individu de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est une modification de la vitesse du développement de l'individu mais pas dans le sens où il se développe tout simplement plus rapidement et atteint sa maturité sexuelle et physique plus rapidement, mais plutôt dans le sens ou simplement il devient adulte plus rapidement, c'est-à-dire qu'il atteint sa maturité sexuelle sans qu'il ne soit complètement développé, que ce soit physiquement ou mentalement.







C'est un phénomène que l'on peut observer chez les chiens.
Les chiens ont un caractère plutôt joueur et ils n'aiment pas la solitude, ce sont des caractères que l'on retrouve chez les louveteaux.
Aussi physiquement les chiens sous forme adulte ressemblent plus aux louveteaux qu'au loups adultes.
Les chiens, étant tous des descendants des loups ont donc hérités des caractéristiques juvéniles de leurs ancêtres et les ont conservées même au stade adulte.
Un autre exemple sont les axolotls.
Les axolotls sont des batraciens que l'on trouve dans les hauts lacs mexicains.
Dans leur cas, c'est différent du cas des chiens, les axolotls sont capables de se reproduire à l'état larvaire.
A l'état « adulte » il conserve se branchies qui sont typiques du stade larvaire.
Mais la différence avec les chiens, c'est que certains axolotls se transforment en salamandre et se reproduisent donc car ils ont atteint leur « stade adulte ».
Mais certains se reproduisent même s'ils restent sous cette forme larvaire comme si leur forme adulte était incomplète ou inachevée.
Mais cela n'arrive que dans certaines conditions, c'est ce qu'on appelle une néoténie facultative.

Voici un autre exemple avec des oursins, la néoténie provoque une modification morphologique très graduelle, la durée de ce processus, dans ce cas-là, est de 25 millions d'années.




On voit que le juvénile ancestral ne possède que les plaques vertes et les plaques bleues mais en grandissant développes les rouges et les oranges, mais au fil des générations les plaques rouges et orange disparaissent à leur tour et l'adulte d'aujourd'hui ne possède que les plaques bleues et vertes comme le juvénile ancestral.

La néoténie est causée par des mutations génétiques perturbant les gènes de la métamorphose (comme ceux des hormones thyroïdiennes) ou par des facteurs environnementaux (températures basses, manque de nourriture, prédation), qui ralentissent le développement physique tout en permettant la maturation sexuelle, offrant parfois un avantage évolutif dans des milieux stables.

## Exemples d'animaux :

### 1. L'axolotl (Ambystoma mexicanum)



L'axolotl est l'exemple le plus célèbre de néoténie.

Ce salamandre aquatique conserve toute sa vie des branchies externes, une nageoire caudale et une capacité à régénérer des membres, des organes et même des parties de son cerveau.

Contrairement à la plupart des amphibiens, l'axolotl ne subit pas de métamorphose complète pour devenir un adulte terrestre.

Il reste aquatique et conserve ses branchies, ce qui lui permet de respirer sous l'eau.

2. Le protée (Proteus anguinus)

Le protée, également appelé "salamandre des grottes", vit dans les eaux souterraines des grottes d'Europe.

Comme l'axolotl, il conserve des branchies externes et une peau dépigmentée tout au long de sa vie.
Il est aveugle, une adaptation à son habitat sombre, et se nourrit principalement de petits crustacés.
La néoténie permet au protée de rester adapté à un environnement pauvre en lumière et en ressources, où une métamorphose vers une vie terrestre serait désavantageuse.

3. Certaines espèces de tritons

Certains tritons, comme le triton crêté (*Triturus cristatus*), peuvent présenter des cas de néoténie facultative.
Dans des conditions environnementales spécifiques (comme un manque d'iode ou des températures froides), ces tritons conservent leurs branchies et restent aquatiques plutôt que de subir une métamorphose complète.
Le fait que cette néoténie ne se manifeste que sous certaines conditions permet aux tritons de s'adapter à des environnements changeants, en restant dans un habitat où les ressources sont plus abondantes.

4. Les olms (Necturus maculosus)

Les olms, ou "salamandres à taches", sont des amphibiens nord-américains qui conservent leurs branchies externes et leur queue aplatie à l'âge adulte. Ils vivent principalement dans les cours d'eau et les lacs, où ils se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés.
La néoténie chez les olms leur permet de rester des prédateurs efficaces dans leur habitat aquatique, sans avoir besoin de s'adapter à une vie terrestre.

5. Les larves de certains insectes

Certains insectes, comme les libellules ou les éphémères, passent par des stades larvaires aquatiques prolongés.
Bien que ce ne soit pas une néoténie au sens strict, certaines espèces conservent des traits larvaires pendant une grande partie de leur vie, ce qui leur permet de profiter des ressources abondantes dans les milieux aquatiques.
Ce prolongement du stade larvaire permet à ces insectes de maximiser leur croissance et leur survie avant de devenir adultes, souvent pour une courte période de reproduction

6. Les humains et la néoténie

Certains scientifiques suggèrent que les humains présentent des traits néoténiques par rapport à nos ancêtres primates.
Par exemple, notre crâne arrondi, notre faible pilosité corporelle et notre capacité à apprendre tout au long de notre vie pourraient être des caractéristiques juvéniles conservées à l'âge adulte.

## 3.1.2 : La progenèse

La progenèse est une modification de la durée du développement.
Chez le descendant, la durée de développement est raccourcie, soit par délétion de caractère ou alors par raccourcissement de caractère, la taille adulte finale est plus petite et la maturité sexuelle est atteinte beaucoup plus rapidement.
On le voit sur les cartouches de Haeckel que le temps de développement des caractères reste le même, mais le curseur s'arrête plus tôt, proche du stade juvénile.
Ainsi, lorsque la cartouche s'arrête, l'organisme a déjà atteint sa maturité sexuelle, même s'il ressemble encore à un juvénile.




Ce n'est pas la même chose que la néoténie car dans le cas de la néoténie, les caractères juvéniles persistent à l'âge adulte, alors qu'avec la progenèse, les caractères restants se développent plus vite.
L'organisme atteint donc sa maturité sexuelle plus tôt, mais reste plus petit que son ancêtre.

Voici un exemple concret, prenons le cas des oursins.
On voit que leurs ancêtres ont pendant leur stade juvénile une mâchoire mais qu'ils la perdent quand ils atteignent l'âge adulte.
Leur descendant lui perd complètement le caractère qui stipule qu'il va perdre sa mâchoire, il atteint sa maturité sexuelle et sa forme adulte au moment où l'ancêtre lui a terminé son stade juvénile, il est donc adulte mais sous la forme du juvénile ancêtre.




La progenèse est un mécanisme évolutif qui permet à certaines espèces de s'adapter à des environnements changeants, comme des ressources limitées ou des prédateurs.
En devenant adultes plus tôt, ces organismes peuvent se reproduire plus rapidement, ce qui favorise leur survie.
La progenèse résulte de mutations accélérant la reproduction ou de stress environnementaux (surpopulation, ressources limitées, températures élevées), poussant l'organisme à se reproduire précocement, souvent à un stade larvaire, pour survivre dans des conditions hostiles ou instables.

## Exemples d'animaux

### 1. Les salamandres du genre Ambystoma

Certaines espèces de salamandres, comme Ambystoma tigrinum, peuvent manifester une progenèse dans des conditions environnementales particulières.
Par exemple, dans des étangs temporaires ou des zones où les ressources sont limitées, les larves peuvent se reproduire avant d'atteindre leur forme adulte.
Cette stratégie leur permet de coloniser rapidement de nouveaux habitats avant que ceux-ci ne deviennent hostiles.

2. Les Polychètes

Certains vers marins, comme ceux de la famille des Syllidae, présentent une progenèse appelée épitokie.
Lors de cette phase, une partie du corps du ver se transforme en un individu reproducteur (appelé épitoque), qui se détache pour aller se reproduire.
Ce segment spécialisé, rempli de gamètes, nage vers la surface pour libérer ses cellules reproductrices, assurant ainsi la dispersion des gènes sans que l'individu entier ne subisse de métamorphose complète.

3. Les Crustacés : Sacculina carcini

Sacculina carcini est un crustacé parasite qui infecte les crabes.
Sa larve, appelée cypris, se fixe sur le crabe et se développe en un sac reproducteur qui prend le contrôle des hormones de son hôte.
Ce parasite induit une progenèse fonctionnelle, il empêche le crabe de muer et de se reproduire normalement, tout en utilisant ses ressources pour produire ses propres larves.

Ce cas illustre comment la progenèse peut être exploitée dans des stratégies parasitaires.

4. Les Insectes : Les Pucerons

Chez certains pucerons, comme ceux du genre Aphis, des individus peuvent se reproduire de manière asexuée (par parthénogenèse) à un stade juvénile, sans attendre leur maturité complète.
Cette progenèse permet une multiplication rapide de la population, surtout dans des environnements où les ressources sont abondantes mais éphémères, comme les jeunes pousses de plantes.

5. Les Échinodermes : Les Oursins



Certaines espèces d'oursins, comme Heliocidaris erythrogramma, peuvent présenter une progenèse dans des conditions de stress environnemental. Les larves, normalement planctoniques, peuvent se métamorphoser précocement en oursins miniatures capables de se reproduire. Cette adaptation leur permet de coloniser des zones où les adultes auraient du mal à survivre, assurant ainsi la pérennité de l'espèce.

6. Les Rotifères Bdelloïdes



Les rotifères bdelloïdes sont des micro-organismes d'eau douce connus pour leur capacité à se reproduire par parthénogenèse.
Dans des conditions défavorables, certaines larves peuvent se reproduire avant d'atteindre leur taille adulte, assurant une descendance rapide.
Cette progenèse est un exemple de stratégie de survie dans des milieux imprévisibles.

7. Les Nématodes : Strongyloides stercoralis



Strongyloides stercoralis est un nématode parasite qui peut présenter une progenèse dans certaines conditions.
Les larves, normalement destinées à devenir des adultes libres dans le sol, peuvent se transformer en larves infectieuses capables de se reproduire précocement.
Cette adaptation permet au parasite de maintenir son cycle de vie même en l'absence d'un hôte définitif.

# 3.2 : Les péramorphoses

Les péramorphoses sont des hétérochronies qui accélèrent le développement des êtres vivants leur permettant de développer plus de caractères que leurs ancêtres.

## 3.2.1 : L'accélération

L'accélération est une modification de la durée de développement des caractères.
Comme on le voit sur les cartouches de Haeckel, la taille adulte ne change pas, cependant la vitesse à laquelle les caractères apparaissent est augmentée.
Ainsi, la durée de développement des caractères est simplement réduite à tel point que l'on peut rajouter des caractères sans pour autant retarder l'arrivée de la forme adulte et de la maturité sexuelle.
Ce phénomène est souvent lié à des pressions évolutives, comme la nécessité de se reproduire plus rapidement dans un environnement compétitif ou hostile.
On peut observer ici que cette hétérochronie utilise le deuxième principe de Haeckel, appelé la condensation par accélération.




Voici un exemple avec les oursins fouisseurs ou, sur dix millions d'années, on voit qu'au fil des générations, un caractère est apparu et encore plus tard dans son évolution.
Ce caractère, une fois acquis, s'exprime de plus en plus tôt au fil des générations suivantes, grâce à l'accélération.
Ce caractère est rallongé, laissant moins de temps aux deux premiers caractères pour s'exprimer.
Cela montre comment l'accélération permet à de nouvelles adaptations de se fixer plus rapidement dans une population.
On voit donc que l'oursin s'allonge de plus en plus dans sa forme adulte au fil des générations, ce qui lui permet de mieux se cacher dans le sable.



## Exemples d'animaux :

### 1. Le Triton crêté (*Triturus cristatus*)

C'est l'un des exemples les plus documentés concernant la morphogenèse des membres chez les amphibiens. Contrairement à ses ancêtres, ce triton présente une vitesse de croissance fulgurante de ses extrémités durant la phase larvaire.

Le mécanisme : Il ne s'agit pas d'une extension de la durée de croissance, mais d'une augmentation de la cadence de division cellulaire au niveau des bourgeons de membres.
Les processus génétiques qui pilotent la formation des doigts s'activent de manière beaucoup plus intense.

Le résultat : L'animal développe des membres fonctionnels et robustes bien plus tôt dans son cycle de vie que les autres salamandres.
Cette avance morphologique lui permet d'occuper des niches écologiques complexes et d'échapper plus efficacement aux prédateurs aquatiques dès le plus jeune âge.

### 2. Le Cerf élaphe (Cervus elaphus)

Alors que certains cervidés disparus jouaient sur le temps, le cerf élaphe moderne est un modèle d'accélération métabolique pour la production de ses bois.

Le mécanisme : Chaque année, le cerf doit reconstruire une structure osseuse massive en un temps record (quelques mois seulement).
Le tissu cartilagineux se transforme en os à une vitesse qui n'a aucun équivalent dans le règne animal pour un tissu permanent.

Le résultat : Cette "poussée" accélérée produit des bois ramifiés et denses avant la saison des amours.
C'est un trait peramorphique où l'accélération du développement somatique permet

d'obtenir un caractère sexuel secondaire hypertrophié sans augmenter la durée globale de la gestation ou de la croissance juvénile.

3. Le Narval (Monodon monoceros)

La célèbre "corne" du narval, qui est en réalité une dent incisive gauche, représente un cas d'école d'accélération localisée d'un organe dentaire.



Le mécanisme : Chez les autres cétacés odontocètes, la croissance des dents est régulée et limitée.
Chez le narval mâle, le signal génétique de croissance de cette dent spécifique est "boosté".
La vitesse de dépôt de la dentine est accélérée de manière asymétrique.

Le résultat : La dent perce la lèvre et se projette vers l'avant à une vitesse telle qu'elle forme une lance spiralée pouvant atteindre trois mètres.
Ce trait dépasse largement le stade de développement dentaire de n'importe quel autre mammifère marin.

4. Le Moineau domestique (Passer domesticus)

Dans certaines populations nordiques, le moineau domestique présente une accélération de la croissance post-natale pour s'adapter aux étés courts.

Le mécanisme : Les oisillons présentent un taux métabolique plus élevé qui accélère la calcification du squelette et le développement du plumage par rapport aux populations des zones tempérées.

Le résultat : Un temps de séjour au nid réduit.
En accélérant son développement, l'oiseau atteint sa maturité physiologique plus vite, ce qui lui permet de quitter le nid avant les premières chutes de température brutales, optimisant ainsi ses chances de survie hivernale.

## 3.2.2 : Hypermorphose




L'Hypermorphose est une modification de la durée de développement.
Contrairement à ses ancêtres, l'organisme concerné voit son développement s'allonger, ce qui retarde l'atteinte de la maturité sexuelle et de la forme adulte.
Ce processus permet l'ajout de nouveaux caractères en fin de développement, selon le principe d'addition terminale décrit par Haeckel.




Par exemple, chez les oursins, sur une période d'environ six millions d'années, au fil des générations, ils ont vu leur taille augmenter et de nouvelles plaques apparaître sur leur corps, tandis que leur temps de développement jusqu'à l'âge adulte s'allongeait.
L'hypermorphose est souvent associée à une néoténie retardée, c'est-à-dire un retard de la maturation sexuelle, permettant à l'organisme de continuer à se développer plus longtemps avant d'atteindre l'état adulte.
Ce mécanisme peut être lié à des changements génétiques ou hormonaux, et il est observé dans de nombreux groupes animaux.
Parmi les exemples notables, on trouve les bois des cerfs, les cornes des rhinocéros, ou encore les plumes extravagantes de certains oiseaux, qui résultent d'une croissance prolongée et d'une différenciation morphologique accrue.
Ce processus évolutif favorise l'apparition de nouvelles structures ou fonctions, augmentant ainsi la diversité morphologique et écologique des espèces.



## Exemples d’animaux :

### 1. Megaloceros (Cerf géant des tourbières)

C'est l'exemple le plus célèbre de la paléontologie.
Le *Megaloceros giganteus* possédait des bois démesurés (jusqu'à 3,60 mètres d'envergure).

Le mécanisme : Ce n'est pas que ses bois poussaient plus vite que ceux des autres cerfs, c'est que l'animal a prolongé sa phase de croissance globale.

Le résultat : Comme la taille des bois suit une loi d'allométrie (ils grandissent proportionnellement beaucoup plus vite que le reste du corps), ce "rabiot" de temps de croissance a produit des appendices gigantesques, presque à la limite de la contrainte physique.

### 2. Le cerveau humain

Si l'humain est souvent cité pour sa néoténie (aspect juvénile du visage), son cerveau est un pur produit d'hypermorphose.

Le mécanisme : Chez la plupart des primates, la croissance rapide du cerveau et la prolifération des neurones ralentissent drastiquement peu après la naissance. Chez l'humain, cette fenêtre de développement "embryonnaire" se prolonge durant plusieurs années.

Le résultat : Cette extension temporelle permet d'atteindre un volume et une complexité synaptique uniques. Nous avons littéralement étiré le temps de construction de notre système nerveux.

3. Les Sauropodes (Dinosaures géants)

Le gigantisme de dinosaures comme le *Diplodocus* ou l'*Argentinosaurus* repose en partie sur l'hypermorphose.



Le mécanisme : Pour atteindre une masse de 50 à 80 tonnes, ces animaux ne pouvaient pas se contenter d'une croissance rapide.
Les études histologiques de leurs os montrent qu'ils prolongeaient leur phase de croissance juvénile sur plusieurs décennies avant d'atteindre la maturité.

Le résultat : En repoussant l'arrêt de la croissance (la puberté), ils ont pu accumuler une structure squelettique massive et dominer leur environnement par la taille.

4. Le Grand Pingouin (Pinguinus impennis)

Aujourd'hui disparu, cet oiseau marin illustre l'hypermorphose par rapport à ses cousins plus petits (les petits pingouins actuels).

Le mécanisme : Au lieu d'arrêter sa croissance pour privilégier l'envol rapide (stratégie de survie classique chez les oiseaux), il a prolongé sa phase de développement corporel.

Le résultat : L'oiseau est devenu beaucoup plus grand et lourd, ce qui a entraîné la perte de l'aptitude au vol, mais en a fait un plongeur d'une efficacité redoutable, capable de rester sous l'eau plus longtemps et de chasser des proies plus grosses.

5. Les "Salamandres géantes" du Japon

Bien que certaines salamandres soient pédomorphiques (gardent des caractères larvaires), la salamandre géante du Japon (*Andrias japonicus*) atteint des tailles dépassant 1,50 mètre grâce à une croissance continue et très longue.

Le mécanisme : Elle retarde la sénescence et maintient une phase de croissance active sur de très nombreuses années (elles peuvent vivre plus de 50 ans).

Le résultat : Une morphologie de "super-adulte" qui dépasse de loin les dimensions standards des amphibiens modernes.

# 4 : Évolution en mosaïque

Jusqu'à maintenant je n'ai fait qu'expliquer différentes hétérochronies qui existent et donné des exemples pour la majorité des cas.
Ce qu'il faut prendre en compte par contre c'est que chaque caractère se développe indépendamment des autres, c'est ce qu'on appelle l'évolution en mosaïque et si chaque caractère d'un individu se développe indépendamment des autres, chacun peut aussi développer une hétérochronie différente.
Ainsi, une espèce peut cumuler plusieurs hétérochronies en même temps car elles ne s'appliquent pas sur un être vivant mais sur chaque caractères qui définissent nos corps que ce soient les griffes d'un chat, ces moustaches, ses yeux, ses oreilles, etc.

## 4.1 : L'hyperpédomorphose

Nous pouvons par exemple combiner les deux pédomorphoses, c'est-à-dire la néoténie et la progenèse pour donner l'hyperpédomorphose, la néoténie et la progenèse. Pour rappel, la néoténie rallonge le temps de développement des caractères sans changer la taille adulte finale ce qui résulte en le descendant d'une espèce qui garde des caractéristiques des juvéniles ancestraux (perte de caractères) et la progenèse raccourcis le temps de développement



d'un être vivant soit en raccourcissant le temps de développement des caractères ou en les supprimant.
Sur les cartouches de Haeckel on voit que la néoténie rallonge le temps de développement du caractère jaune et la progenèse supprime le caractère rouge et raccourcis le caractère vert.
Le résultat de l'hyperpédomorphose est donc un adulte plus petit que ses ancêtres, mais dont certains traits juvéniles persistent ou sont exacerbés.
Ce phénomène n'est pas rare dans la nature, il joue un rôle clé dans l'évolution en permettant aux espèces de s'adapter rapidement à de nouveaux environnements.
Par exemple, certaines populations de tritons alpestres montrent des signes d'hyperpédomorphose en réponse à des conditions climatiques changeantes.
Chez les humains, des hypothèses suggèrent que des traits comme une mâchoire moins robuste ou une période de dépendance juvénile prolongée pourraient aussi être liés à des processus pédomorphiques.

## 4.2 : L'hyperpéramorphose




Nous pouvons aussi combiner les deux péramorphoses qui sont donc, l'accélération et l'hypermorphose.
L'accélération réduit le temps de développement des caractères, permettant à un organisme de développer certains traits plus rapidement, sans pour autant retarder la maturité sexuelle ou modifier la taille adulte.
Par exemple, un organisme pourrait acquérir des caractéristiques avantageuses avant d'atteindre sa forme adulte, comme une taille plus grande ou des structures corporelles plus complexes.
L'hypermorphose, en revanche, retarde la maturité sexuelle, ce qui laisse plus de temps au développement des caractères.
Cela permet à l'organisme d'atteindre une forme adulte plus grande, plus tardive, et souvent plus complexe.
Sur les cartouches de Haeckel, on observe clairement que la maturité sexuelle est retardée, tandis que la taille adulte et les caractères morphologiques sont augmentés.
Lorsque ces deux mécanismes se combinent, ils donnent naissance à l'hyperpéramorphose.
Cela se traduit par une forme adulte plus grande, plus tardive et plus complexe, avec une maturité sexuelle retardée.

Ce processus montre comment des changements dans le développement peuvent conduire à des formes adultes plus élaborées, offrant des avantages évolutifs significatifs.
En résumé, l'hyperpéramorphose illustre comment l'accélération et l'hypermorphose agissent ensemble pour transformer les organismes, en ajoutant de nouveaux caractères ou en amplifiant ceux déjà présents, tout en retardant la maturité sexuelle.
Cela permet d'obtenir des formes adultes plus grandes et plus complexes, comme le montrent les études évolutives basées sur les travaux de Haeckel.

## 4.3 : Nanisme

Le nanisme, dans un contexte évolutif, peut résulter de la combinaison de deux mécanismes hétérochroniques, la progenèse et l'accélération.
Ces deux processus sont illustrés sur les cartouches de Haeckel, où l'on observe que les espèces présentant une progenèse plus marquée sont généralement plus petites.
Cependant, l'accélération permet à ces espèces d'acquérir des traits évolutifs innovants en un temps plus court.




Ainsi, un individu peut être plus petit, mais avec des caractéristiques évolutives plus avancées ou diversifiées.
Ce phénomène est particulièrement visible chez certaines espèces animales, où la réduction de la taille s'accompagne d'une complexité accrue ou de spécialisations adaptatives.
Par exemple, certains insectes ou amphibiens montrent une maturité précoce tout en développant des traits morphologiques ou comportementaux nouveaux.
En résumé, la combinaison de la progenèse et de l'accélération peut conduire à un nanisme évolutif, où la petite taille ne signifie pas un manque d'évolution, mais plutôt une stratégie adaptative permettant une diversification rapide des caractères.
Ce mécanisme joue un rôle clé dans la spéciation et l'adaptation des espèces à leur environnement.

## 4.4 : Gigantisme




Nous pouvons aussi combiner la néoténie et l'hypermorphose pour donner le gigantisme.
Cete hétérochronie permet à certains organismes d'atteindre des tailles exceptionnelles par rapport à leurs ancêtres, mais de conserver une apparence morphologique proche du juvénile de l'ancêtre de l'individu.
On voit sur les cartouches de Haeckel que la néoténie rallonge le temps de développement des caractères jaunes et verts et que l'hypermorphose elle rallonge la durée de développement de l'individu.
On pourrait se demander pour quoi il n'y a pas le temps de développer de nouveaux caractères, et bien la néoténie rallonge toujours trop les caractères pour permettre le développement de nouveaux caractères.
L'individu se retrouve donc avec une forme adulte plus grande que celle de son ancêtre mais, qui ressemble à son juvénile morphologiquement.
Le gigantisme peut être influencé par des facteurs environnementaux, comme l'abondance de ressources ou l'absence de prédateurs, qui favorisent une croissance accrue.
Enfin, il est important de noter que ce phénomène n'est pas limité aux animaux, certaines plantes ou champignons peuvent aussi présenter des formes géantes grâce à des mécanismes évolutifs similaires.

# 5 : Les stratégies développementales

Les hétérochronies, comme la néoténie, la progenèse, l'hypermorphose et l'accélération, se distinguent des autres stratégies développementales par leur impact spécifique sur le timing évolutif du développement.
Par exemple, la néoténie retarde ou supprime la métamorphose, ce qui conduit à un adulte conservant des traits juvéniles, tandis que la progenèse entraîne une maturité sexuelle précoce avant la fin du développement somatique.
L'hypermorphose prolonge le développement, permettant l'ajout de nouveaux caractères, et l'accélération augmente la vitesse de développement sans modifier la taille adulte finale.
En revanche, des stratégies comme le développement direct ou le développement indirect ne sont pas des hétérochronies.
Ces stratégies ne modifient pas le timing évolutif des étapes développementales, mais plutôt leur présence ou leur absence.
Ainsi, les hétérochronies impliquent un décalage temporel qui affecte la morphologie adulte de manière héréditaire et évolutive, tandis que les autres stratégies développementales, bien qu'elles influencent la morphologie et le cycle de vie, ne modifient pas le timing évolutif des processus développementaux.

## 5.1 : Le développement direct

Le développement direct se distingue par l'absence de stade larvaire,
Quand un individu à développement direct nait, il nait directement sous une forme miniature de la forme adulte, sans métamorphose intermédiaire.
Dans ce processus, les caractéristiques de l'adulte apparaissent très tôt, souvent dès les premiers stades embryonnaires.
Par exemple, chez certains amphibiens comme les salamandres, les œufs éclosent et les salamandres juvéniles ressemblent déjà aux adultes, c'est-à-dire que le salamandre présente déjà les caractéristiques comme les pattes, la queue, ou encore dans certains cas les motifs propres à l'espèce (cela dépend des espèces, certains développent ces motifs plus tard et naissent sans aucun motif) et est déjà capable de se nourrir et de se déplacer par soi-même.
Contrairement aux espèces à développement indirect (comme les grenouilles, qui passent par un stade têtard), le développement direct évite une phase de transformation radicale.
Ce mécanisme résulte de modifications génétiques et hormonales qui accélèrent ou suppriment des étapes développementales.
Il offre des avantages écologiques, comme la réduction de la vulnérabilité associée aux stades larvaires, ou l'adaptation à des environnements stables où les ressources sont limitées.

En résumé, le développement direct illustre comment l'évolution module le temps du développement pour optimiser la survie et la reproduction, en éliminant les transitions complexes au profit d'une maturation continue et simplifiée.

## 5.2 : Le développement indirect

Le développement indirect est un processus biologique fascinant par lequel un organisme passe par des stades larvaires distincts avant d'atteindre sa forme adulte.
Ce type de développement, observé chez de nombreux invertébrés et certains vertébrés, permet une adaptation optimale à des environnements variés et une répartition efficace des ressources.
Contrairement au développement direct, où l'individu ressemble à une version miniature de l'adulte dès sa naissance, le développement indirect implique une métamorphose entre les différentes phases de vie.
Un exemple emblématique est celui des amphibiens, comme les grenouilles.
Leur cycle de vie commence par une larve aquatique, le têtard, doté de branchies et d'une queue, puis se transforme progressivement en une grenouille adulte, capable de respirer par des poumons et de vivre sur terre.
Chez les insectes, comme les papillons ou les mouches, le développement indirect se manifeste par des stades de larve (chenille), de nymphe (chrysalide) et enfin d'adulte (imago).
Chaque stade remplit une fonction spécifique : la larve se consacre à la croissance et à l'alimentation, tandis que l'adulte est souvent dédié à la reproduction et à la dispersion.
Ce processus présente plusieurs avantages évolutifs.
Il réduit la compétition entre les jeunes et les adultes en occupant des niches écologiques différentes.
Par exemple, les têtards et les grenouilles adultes ne se disputent pas les mêmes ressources alimentaires.
De plus, la phase larvaire permet souvent une dispersion plus efficace, comme chez les insectes dont les larves peuvent se déplacer dans des milieux inaccessibles aux adultes.
Cependant, le développement indirect comporte aussi des défis.
La métamorphose est une période critique où l'organisme est vulnérable aux prédateurs et aux changements environnementaux.
La réussite de ce processus dépend de facteurs externes, tels que la température, la disponibilité de nourriture et l'absence de polluants, qui peuvent perturber les mécanismes hormonaux.

# 6 : Conclusion

Ce TraPe était plus particulier à faire pour moi parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire sur quelque chose qui englobe tous les êtres vivants, mes derniers travaux étaient sur les serpents, les champignons et le Physarum Polycephalum.
J'ai eu du mal à trouver des informations sur ce sujet, c'est pour cette raison que je n'ai pas beaucoup de sources, j'ai principalement utilisé les deux vidéos, une qui parle des hétérochronies fondamentales et une qui parle spécifiquement de la néoténie.
J'ai trouvé cela extrêmement intéressant à faire comme TraPe car c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, et que peu de personnes connaissent dans mon entourage, c'est ce qui a rendu les recherches si compliquées.
En fin de compte je suis satisfait des informations que j'ai réussi à réunir malgré le peu de sources disponibles sur le sujet.

# 7 : Sources

https://www.youtube.com/watch?v=AtOmq9zNkjw
https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/4794/neotenique
https://www.youtube.com/watch?v=XAEX4AleE94
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-progenese-6077/
https://planet-vie.ens.fr
https://axo-exo.jimdofree.com/qu-est-ce-qu-un-axolotl/néoténie/
https://www.mabiologie.com/2025/08/developpement-direct-vs-indirect.html